

## PLAN DE CONSERVACIÓN PARA EL *BARTRAMIA LONGICAUDA*

### RESUMEN EJECUTIVO




El *Bartramia longicauda* es un ave playera de tamaño medio que se reproduce en el noroeste y centro de Norte América y migra hacia el sur de Suramérica en la temporada de no reproducción (Figura 1). Los *Bartramia longicauda* no se agregan en grandes concentraciones en su rango de reproducción y aun están más dispersos en sus áreas de no reproducción. Esta característica presenta los esfuerzos de la investigación y de conservación con el desafío adicional de trabajo a escala de paisaje en todo el rango de la especie.

El *Bartramia longicauda* tiene una población mundial considerable que ha sido aumentando desde 1966 (350.000+ individuos), pero antiguamente la especie fuera mucho más numerosa. Actualmente la especie es más abundante en la Alta Medioeste de Norteamérica, sin embargo ésta es una región donde hay una pérdida constante de pastizales naturales por la agricultura extensiva (los cultivos en hileras).

Las disminuciones sustanciales de la población se ha ocurrido en las provincias de las praderas de Canadá, los estados de Wisconsin y Michigan, la Provincia de Ontario, y a lo largo del Río San Lorenzo (en Nueva York y Ontario). En general existe la preocupación sobre la pérdida y degradación continua de hábitat en el Norte América y Suramérica, además sobre los efectos de agroquímicos.

En su rango de reproducción, los *Bartramia longicauda* prefieren paisajes grandes (100 hectáreas o más) y asociados con pastizales, que ofrecen una mezcla de alturas en su vegetación, incluyendo áreas de hierba corta para el cortejo, así como los de hierba alta para la anidación. En los áreas de migración y no reproducción, los *Bartramia longicauda* usan una gran variedad de hábitats, desde pastizales naturales a zonas cultivadas o de pastoreo. El manejo de las praderas y las prácticas agrícolas y el pastoreo tienen la potencial de afectar en gran medida a esta especie, tanto positiva como negativamente, en todo su rango.



**Figura 1.** Distribución del *Bartramia longicauda* en las zonas de reproducción (en amarillo), sitios de migración (rayado), y de no reproducción (en azul) (basado en Ridgely *et al.* 2003).

**Las principales amenazas para esta especie incluyen:**

- La pérdida y degradación de hábitats, incluyendo su composición, en las áreas de reproducción y no reproducción;
- El uso de agroquímicos en zonas de reproducción y no reproducción; y
- La pérdida y/o degradación de hábitat crítico en los sitios de paradas de la migración.

**Las acciones de conservación recomendadas para hacer frente a las amenazas incluyen:**

- Proteger el hábitat heterogéneo de alta prioridad en las zonas de reproducción, por la creación de incentivos para ganaderos en mantener los hábitats de praderas y pastizales, por ejemplo;
- Conducir las investigaciones para determinar los posibles efectos de los agroquímicos tanto en Norteamérica como Suramérica; y
- Identificar los hábitats críticos en los sitios de paradas y determinar la condición.