




OISEAUX DE RIVAGE

CARTES D'ESPÈCES

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Taille: 43-46 cm Poids: 310-404 g



Le long bec est spécialement adapté pour sonder les terriers de crabe dans la boue et le sable.

REPRODUCTION

Dans la toundra, les oiseaux grattent un bol dans le sol et le tapissent de feuilles, d'herbes ou de lichens.

HABITAT

Marais salés, vasières, plages sablonneuses, terres agricoles, mangroves


COMPORTEMENT

Se rassemblent en groupes pour se reposer, peuvent être territoriaux sur les sites d'alimentation diurnes.

Bécasseau d'Alaska

Calidris mauri

Taille: 14-17 cm Poids: 22-35 g



Ils ont une langue hérissée qui agit comme une éponge pour les aider à aspirer le biofilm, les bactéries et les algues unicellulaires à la surface de la boue.

REPRODUCTION

L'éclosion des poussins culminera à la fin juin et dans les 17 à 18 jours, les poussins se prépareront à migrer à la mi-août.

HABITAT

Vasières, terres agricoles, rivage de lacs

COMPORTEMENTO

Se nourrit jour et nuit avec un comportement de recherche de nourriture lent et régulier sur les vasières.

Barge hudsonienne

Limosa haemastica

Taille: 36-42 cm Poids: 196-358 g




Sourcil blanc

Dos brun foncé avec les taches blanches

Bec orange à la base et noir au bout

En plumage nuptial, le ventre est de couleur cannelle foncée avec des stries noires chez les mâles



Le long bec a une pointe flexible qui peut se plier pour attraper des proies profondément dans la boue.

REPRODUCCIÓN

Monogame et très territorial. Contrairement à de nombreux autres oiseaux de rivage, les adultes partageront la parentalité.

HÁBITAT

Lagunes côtières, marais, côte océanique, champs

COMPORTEMIENTO

Se nourrit généralement au toucher, sondant leurs longs becs dans la boue, submergeant parfois même leur tête.

Bécasseau roussâtre

Calidris subruficollis

Taille: 18-21 cm Poids: 46-81 g



Bec noir et court



Dos moucheté de brun et de noir




Visage pâle, de couleur crème



Plumage général de couleur crème sur le corps et la tête



Pattes jaunes



Avec ses grands yeux audacieux et ses traits délicats, cette espèce est considérée comme l'un des oiseaux de rivage les plus « élégants ».

REPRODUCCIÓN

La parade nuptiale a lieu en leks, c'est-à-dire lorsqu'un groupe de mâles se rassemble au même endroit pour faire une démonstration animée pour attirer les femelles.

HÁBITAT

Prairies, pâturages, terres agricoles

COMPORTAMIENTO

Marche rapidement et fait de hautes enjambées, ramassant les insectes effrayés par le groupe.

Avocette d'Amérique

Recurvirostra americana

Taille: 43-47 cm Poids: 275-350 g




Long bec fin et courbé vers le haut

Corps noir et blanc

Tête et cou roux en plumage nuptial

Très longues pattes



La tête et le cou rouillés de cet oiseau distingué seront d'un gris pâle en dehors de la saison de reproduction.

REPRODUCCIÓN

Les poussins ne sont pas seulement capables de marcher, mais aussi de nager pour éviter les prédateurs.

HÁBITAT

Marais salés et d'eau douce, étangs salés, vasières, champs


COMPORTAMIENTO

Patauge dans l'eau, déplaçant le bec d'avant en arrière pour filtrer ses proies.

Phalarope de Wilson

Phalaropus tricolor

Taille: 22-24 cm Poids: 30-85 g



Se nourrit souvent dans des eaux plus profondes, nageant en cercles pour créer un vortex et attirer les insectes à la surface.

REPRODUCCIÓN

La femelle plus colorée abandonnera le mâle pour s'occuper des œufs et des poussins, pour trouver un autre compagnon.

HÁBITAT

Lacs salés, marais côtiers, étangs d'épuration

COMPORTAMIENTO

Se nourrit souvent dans des eaux plus profondes, nageant en cercles pour créer un vortex et attirer les insectes à la surface.

Petit Chevalier

Tringa flavipes

Taille: 23-25 cm Poids: 65-95 g



Bec mince,
droit et foncé



Tête grisâtre
avec des stries
plus foncées sur
la couronne




Dos et ailes
gris-brun stries



Gorge et
poitrine pâles
avec des
stries sombres



Longues
pattes
jaunes



Plutôt que de se rassembler en grands groupes en dehors de la saison de reproduction, ils sont souvent plus dispersés dans une grande zone.

REPRODUCCIÓN

Niche généralement sous un buisson près de plans d'eau dans les prés et les boisés ouverts du nord du Canada.

HÁBITAT

Zones humides peu profonds, champs inondés

COMPORTAMIENTO

Fait de hautes enjambées dans les eaux peu profondes, faisant des coups rapides pour attraper sa proie.

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

Taille: 23-26 cm Poids: 90-220 g



Bec droit, fin
et noir




Dos moucheté
de brun, blanc et
noir



Visage,
poitrine et
ventre roux



Pattes
sombres



Le Bécasseau maubèche rufa est une espèce menacée au Canada et aux États-Unis, en raison de la perte d'habitat dans les principales haltes migratoires.

REPRODUCCIÓN

Après avoir partagé le travail d'incubation, le mâle chassera agressivement la femelle du nid lorsque les poussins éclosent.

HÁBITAT

Plages sablonneuses, marais salés, vasières, mangroves


COMPORTAMIENTO

Fait l'un des plus longs vols migratoires de tous les oiseaux de la toundra arctique à la Terre de Feu, au sud du Chili.

Tournepierre à collier

Arenaria interpres

Taille: 21-25 cm Poids: 91-130 g



Ce petit oiseau trapu effectuera son premier vol à 19 jours, puis quelques jours plus tard, il parcourra des milliers de kilomètres à une vitesse pouvant atteindre 65 km/h.

REPRODUCCIÓN

Niche près de la côte dans l'arctique, occupant souvent le même nid pendant plusieurs années.

HÁBITAT

Zones côtières rocheuses, plages sablonneuses, vasières


COMPORTEMIENTO

Leur nom vient de leur comportement unique consistant à utiliser leur bec pour retourner des pierres, des coquillages et d'autres débris à la recherche de nourriture.

Bécasseau semipalmé

Calidris pusilla

Taille: 15-18cm Poids: 18-52 g



Ventre blanc, avec de légères rayures

Dos brun grisâtre, gris plus pâle en plumage non nuptial

Pattes noires

Le Bécasseau semipalmé tire son nom commun des petites palmures entre ses orteils.

REPRODUCCIÓN

Éclosion de fin juin à juillet, en seulement 16 à 19 jours, les poussins sont capables de voler.

HÁBITAT

Vasières, rivage de lacs, plages

COMPORTAMIENTO

Se déplace rapidement, sondant la boue pour se nourrir et chassant les concurrents.

Pluvier kildir

Charadrius vociferus

Taille: 20-28 cm Poids: 75-128 g




Anneau
rouge
autour de
l'œil

Deux anneaux
noirs
autour
du cou

Dos, ailes et tête
marrons

Pattes
grisâtres
pâles



Nommé pour leur cri d'alarme, un kill-deea, qui se répète fréquemment surtout en vol.

REPRODUCTION

Les adultes feront semblant d'avoir une aile cassée pour éloigner les prédateurs de leurs nids et de leurs poussins.

HABITAT

Champs, vasières, espaces de stationnement, terrains de golf

COMPORTEMENTO

Comme les autres pluviers, il chasse ses proies à vue, en utilisant la stratégie course-arrêt-regarde.


Huitrier d'Amérique

Haematopus palliatus

Taille 40-44 cm Poids: 400-700 g



Un bec épais,
rouge-orange



Plumage brun sur
le dos, blanc sur
le ventre



Plumage
noir sur la
tête et le
cou



Pattes longues,
épaisses et
quelque peu



Ce sont les seuls oiseaux côtiers capables d'ouvrir de grosses palourdes et des huîtres avec leur bec puissant.

REPRODUCCIÓN

Les adultes formeront des couples reproducteurs à vie, nichant sur des plages de sable couvertes de coquillages, souvent sur des îles-barrières.

HÁBITAT

Playas de barrera, marismas salinas, zonas costeras rocosas

COMPORTAMIENTO

Territorial et agressif pendant la reproduction. Cris fort et aigu pour communiquer entre eux.

Légende des aliments des oiseaux de rivage



Crabes




Coléoptères



Petits fruits




Biofilm



Insectes



Palourdes et
huîtres



OEUfs de
limules



Mouches des
rivages



Crevettes
des salines



Escargots



Vers